

Médecin traitant (cachet)

Ce dépliant est uniquement fourni à titre d'information complémentaire. Les conseils de votre médecin traitant prévalent toujours sur les informations qu'il contient.

Pour toute question supplémentaire, le personnel spécialisé chargé de votre suivi se tient à votre disposition à tout moment.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous rendre sur notre site web www.klsmartin.com ou scanner le code QR :



Solutions innovantes x Procédure bien établie

Vos avantages

- Une conception innovante, moderne et inspirée des structures anatomiques permet une plus grande amplitude de mouvement de la mâchoire après l'opération.
- Une prothèse réalisée à partir de vos clichés scanner personnels, associée à un contrôle à l'aide d'outils de simulation numériques modernes, offre une précision d'ajustement optimale et une grande liberté de conception.
- La combinaison de matériaux réduit les réactions de rejet, offre des propriétés de glissement idéales et garantit une grande stabilité de l'implant.

KLS Martin SE & Co. KG

Une société de KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Allemagne
Tél. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

91-350-77-04 · Rév. 02 · 2026-06 · Imprimé en Allemagne · Copyright by
KLS Martin SE & Co. KG · Tous droits réservés · Sous réserve de modifications
techniques

KLS martin
GROUP



IPS Implants® TMJ Prosthesis

Information aux patients

www.klsmartin.com

L'articulation temporo-mandibulaire

L'articulation temporo-mandibulaire est une articulation unique dans le corps humain en raison de la complexité de sa géométrie, de son fonctionnement, des structures impliquées et des facteurs qui l'influencent.

Si vous tenez entre les mains ce dépliant destiné aux patients, il est probable que vous souffriez depuis un certain temps d'une pathologie de l'articulation temporo-mandibulaire et que vous deviez bénéficier sur le long terme d'une substitution articulaire, c'est-à-dire d'une prothèse.

Pourquoi une prothèse serait-elle une bonne chose ?

Votre articulation temporo-mandibulaire est indispensable à des fonctions fondamentales telles que la mastication, la parole et la déglutition.

Le remplacement chirurgical de l'articulation temporo-mandibulaire peut entraîner un soulagement durable de la douleur et le rétablissement de ces fonctions. Un trouble non traité peut en outre altérer davantage ces fonctions et entraîner d'autres complications.


La reconstruction par prothèse est indiquée pour les patients atteints de pathologies sévères de l'articulation temporo-mandibulaire, qui peuvent s'accompagner, par exemple, de limitations fonctionnelles du système masticoire, d'une ouverture buccale réduite ou de douleurs au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire.

Par exemple dans les cas suivants :

- Arthrose
- Ankylose
- Traumatisme
- Anomalies congénitales
- Malformations
- Tumeurs
- Perte de structures de l'articulation temporo-mandibulaire


À quoi ressemblera ma prothèse de l'articulation temporo-mandibulaire ?

Vous voyez ci-dessous trois exemples de prothèses de l'articulation temporo-mandibulaire, qui seront fabriquées sur mesure spécialement pour vous et qui seront soumises à des tests numériques en fonction de scénarios de sollicitation spécifiques.



Comment se déroulera l'opération ?

La vidéo suivante vous permet de suivre le déroulement standard d'une reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire à l'aide d'une prothèse.



<https://www.youtube.com/watch?v=jvvqCtMEg98>



Facteurs de risque

La probabilité d'effets secondaires est influencée par certains facteurs de risque. Si nécessaire, ceux-ci peuvent être discutés en détail avec votre médecin traitant.

Parmi ces facteurs de risque, on peut citer :

- des interventions antérieures de chirurgie ouverte sur l'articulation temporo-mandibulaire
- des antécédents de chirurgies multiples ou de chirurgie de révision de l'articulation temporo-mandibulaire
- des lésions existantes ou réparées du nerf facial
- des antécédents de douleurs chroniques intenses
- des facteurs psychologiques : stress psychosocial tel que l'anxiété, la dépression ou d'autres troubles psychiques
- le sexe : les femmes présentent un risque accru par rapport aux hommes
- le tabagisme
- les maladies systémiques - arthropathie inflammatoire/diabète

Effets secondaires

Toute intervention chirurgicale peut entraîner des complications.

Les effets secondaires possibles peuvent être les suivants :

- Descellement de l'implant
- Rupture de l'implant
- Sensibilité au matériau ou réactions allergiques
- Altération qualitative et/ou quantitative des tissus durs et/ou mous, p. ex. formation osseuse anormale ou fusion du tissu osseux dans les tissus mous, lésions nerveuses affectant les mouvements ou la sensibilité du visage
- Infections, p. ex. exemple infection de la prothèse
- Troubles de la cicatrisation
- Déplacement de l'articulation, p. ex. en raison d'un trouble de l'occlusion
- Douleurs persistantes (chroniques)